



TUTORAT UE ATC 2015-2016 – Tête et cou

CORRECTION Colle commune – 09/05/2016

Anatomie tête et cou

Pr Captier, Bonafé et Favre de Thierrens

QCM n°1 : ABDE

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. L'artère ophtalmique passe par le canal optique.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Ou nerf trochléaire.

QCM n°2 : ACE

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elle permet l'insertion du muscle grand oblique
- C. **Vrai.**
- D. L'artère angulaire provient de l'artère faciale.
- E. **Vrai.**

QCM n°3 : BCD

- A. Faux. Il est situé entre l'os lacrymal et l'os maxillaire.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. L'os vomer s'articule en bas avec la lame horizontale de l'os palatin et l'os maxillaire (palais dur).

QCM n°4 : BE

- A. Faux. Attention vrai pour les muscles cutanés !
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Egalement par le muscle occipito-frontal qui est un muscle épicroânien. L'ensemble contribue à l'expression du visage.
- D. Faux. Les muscles pré-vertébraux sont innervés par les nerfs cervicaux supérieurs C1 à C3.
- E. **Vrai.**

QCM n°5 : ABCD

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Le nerf phrénique est en avant du muscle scalène antérieur.

QCM n°6 : ACD

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Il s'insère sur la ligne temporale inférieure.
- C. **Vrai.**

- D. **Vrai.**
- E. Faux. Ils sont vascularisés par des collatérales de l'artère maxillaire (artères ptérygoïdiennes médiale et latérale) qui est une terminale de l'artère carotide externe.

QCM n°7 : F

- A. Faux. Elle donne les artères intercostales antérieures.
- B. Faux. Elle donne une branche cervicale postérieure à destination des muscles du cou.
- C. Faux. Elle naît par l'intermédiaire du tronc thyro-cervical
- D. Faux. C'est un rapport antérieur.
- E. Faux. L'artère scapulaire dorsale naît dans la région inter ou post-scalénique.
- F. **Vrai.**

QCM n°8 : AC

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elles sont issues de sa portion intermédiaire.
- C. **Vrai.** Elle donne les artère méningée moyenne et artère petite méningée.
- D. Faux. Il y a 14 collatérales : 3 dans la portion initiale, 8 dans l'intermédiaire et 3 terminales.
- E. Faux. Elle en sort via le foramen sphéno-palatin.

QCM n°9 : AD

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elle forme une boucle à concavité inférieure.
- C. Faux. La veine faciale reste superficielle pendant tout son trajet.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Elle se termine au niveau de l'angle interne de l'œil.

QCM n°10 : CDE

- A. Faux. Pas de collatérales dans la portion cervicale.
- B. Faux. On la retrouve dans la région cervicale (bi-carotidienne puis rétro-stylienne), intra pétreuse, intra caverneuse puis intra céphalique.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Ce sont les artères cérébrales antérieures et moyennes.

QCM n°11 : ABD

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.** Il s'agit du sinus hypophysaire ou inter-caverneux ou coronaire.
- C. Faux. Les sinus pétreux sont issus des sinus caverneux et se drainent dans les sinus latéraux ou dans les veines jugulaires internes.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Le confluent des sinus draine le sang de la partie superficielle de l'encéphale.

QCM n°12 : ACDE

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le drainage encéphalique s'effectue par le LCR.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°13 : ABCDE

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°14 : ABCD

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Il s'agit des processus vocaux des cartilages aryénoïdes.

QCM n°15 : AC

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elle passe à la face postérieure de l'artère carotide commune.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. L'isthme est vascularisé par des branches provenant des artères thyroïdiennes supérieures, inférieures, et lma.
- E. Faux. Il s'effectue majoritairement vers le tronc veineux brachio-céphalique gauche.

QCM n°16 : ABC

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.** Il s'agit du fascia parotidien.
- D. Faux. Elles sortent au niveau du bord antérieur et de la face antéro-médiale de la glande parotide.
- E. Faux. Le nerf facial est le rapport intrinsèque le plus superficiel de la glande.

QCM n°17 : BDE

- A. Faux. Elle est assurée par le nerf facial et permet la sécrétion salivaire.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. La veine linguale est un rapport profond de la glande submandibulaire.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°18 : ADE

- A. **Vrai.**
- B. Faux. C'est l'artère linguale qui donne une branche sublinguale.
- C. Faux. Le muscle génio-glosse est médial à la glande sublinguale.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°19 : ACDE

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le versant postérieur du condyle mandibulaire n'est pas recouvert de fibro-cartilage, il est lisse et non fonctionnel.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°20 : ABC

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux.
- E. Faux.