

TUTORAT UE APB 2013-2014 – Petit Bassin

CORRECTION Séance n°1 – Semaine du 07/04/2014

Bassin osseux – 1/2 paroi pelvi-périnéale Pr Pujol

QCM n°1 : B, D

- A. Faux. Le détroit supérieur sépare le grand bassin ou "pelvis major" du petit bassin ou "pelvis minor".
- B. **Vrai.**
- C. Faux. L'utérus n'est dans le grand bassin que lors de la gestation ou de pathologies.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Le canal anal et non le rectum. Le rectum est situé dans la loge dorsale du petit bassin.
- F. Faux.

QCM n°2 : A

- A. **Vrai.**
- B. Faux. A grand axe oblique en bas et en arrière.
- C. Faux. Le quatrième ligament est le ligament arqué du pubis et non le ligament transverse du périnée. Le ligament arqué du pubis (ou pubien inférieur) est situé au-dessus et en avant du ligament transverse du périnée.
- D. Faux. Muscles obliques externes et non obliques internes.
- E. Faux. L'urètre et non l'uretère.
- F. Faux.

QCM n°3 : C, D

- A. Faux. Groupe des articulations synoviales avec mobilité restreinte, les synoviales planes.
- B. Faux. 30°
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai**
- E. Faux. En arrière et au dessus du sillon pré-auriculaire.
- F. Faux.

QCM n°4 : D

- A. Faux. Ils sont répartis en un groupe supérieur et un inférieur.
- B. Faux. Tubérosités de l'ilium et non de l'ischium.
- C. Faux. L'épine postéro-inférieure et non postéro-supérieure.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Ils sont composés de 2 faisceaux.
- F. Faux.

QCM n°5 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. A grand axe transversal.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Les ligaments sacro-coccygiens ventraux ont 2 faisceaux et les latéraux ont 3 faisceaux.
- E. **Vrai.**

F. Faux.

QCM n°6 : A, B, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Seulement le dorsal. Le ventral se fixe sur S2.
- D. Faux. Ce sont des trochoïdes.
- E. **Vrai.** A distance.
- F. Faux.

QCM n°7: C, E

- A. Faux. Le bord latéral du coccyx et non la face antérieure.
- B. Faux. Le long de la branche ischio pubienne.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Attention c'est au nerf du muscle obturateur interne et non le nerf obturateur interne.
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°8 : C, E

- A. Faux. Ce sont des articulations peu ou pas mobiles.
- B. Faux. Il y a augmentation du diamètre bi-ischiatique.
- C. **Vrai.** Attention à ne pas confondre diamètre sacro-pubien et promonto-pubien.
- D. Faux. Ces mouvements se font d'avant en arrière donc dans le plan sagittal.
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°9 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elles sont moins marquées.
- C. Faux. Elle est moins accentuée.
- D. **Vrai.** Cela permet ainsi une mobilisation plus simple.
- E. Faux. Elles sont plus grandes.
- F. Faux.

QCM n°10 : B, E

- A. Faux. Le bord supérieur de la symphyse pubienne.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Son orientation est perpendiculaire à l'axe ombilico-coccygien et forme une angulation d'environ 60° avec l'horizontale.
- D. Faux. De rayon.
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°11 : A, B, C, D

- A. **Vrai**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.** Ils mesurent tous deux 12 cm.
- E. Faux. C'est un diamètre obstétrical.
- F. Faux.

QCM n°12 : A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Par la flèche sacrale qui mesure la profondeur de la concavité par rapport à la corde.
- C. Faux. Le bord supérieur du ligament sacro-épineux.
- D. Faux. De l'apex du sacrum et non de la base.

- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°13 : C, E

- A. Faux. Il s'agit d'un orifice ostéo-fibreux.
- B. Faux. Les branches inférieures du pubis limitent le détroit inférieur en avant et non latéralement.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le plan est orienté vers le bas et l'arrière.
- E. **Vrai.**
- F. Faux

QCM n°14 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Les membranes obturatrices appartiennent au plan intermédiaire.
- C. Faux. Les éléments viscéraux sont dans la cavité pelvi périnéale, ils n'appartiennent pas aux parois.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Ils sont d'origine endopelvienne.
- F. Faux.

QCM n°15 : B, D, E

- A. Faux. Bord supérieur du grand trochanter.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Le nerf sciatique passe dans le canal infra-piriforme.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Ils passent tous par la petite ouverture sciatique.
- F. Faux.

QCM n°16 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Transversalement.
- C. Faux. Pas par les obturateurs internes.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Vers le bas et l'arrière.
- F. Faux.

QCM n°17 : A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Au canal anal et non au rectum.
- C. Faux. C'est l'inverse.
- D. Faux. Les 2 faisceaux de terminaison sont le muscle pubo-vaginal et pubo-rectal, celui-ci donne 3 faisceaux dont le faisceau rétro-rectal.
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°18 : F

- A. Faux. Il a pour origine la face postérieure du corps du pubis.
- B. Faux. L'urètre et non l'uretère.
- C. Faux. Il se termine au-dessus du muscle ilio-coccygien.
- D. Faux. Il s'agit de ses deux faisceaux rétro-rectaux
- E. Faux. Il va sur le ligament sacro-coccygien ventral.
- F. **Vrai.**

QCM n°19 : A, B, D, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**

- C. Faux. Ils adhèrent aux ligaments sacro-épineux.
- D. Vrai.**
- E. Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°20 : A, D

- A. Vrai.**
- B. Faux. Les fosses ischio-rectales.
- C. Faux. Le fascia pelvien pariétal ne recouvre que la face supérieure du diaphragme pelvien.
- D. Vrai.** Les branches de l'artère illiaque interne vascularisant le diaphragme pelvien sont : les artères pudendales internes, vésicales inférieures et obturatrices
- E. Faux. Il s'agit du muscle pubo-vaginal qui est un faisceau du muscle pubo-coccygien.
- F. Faux.