

# TUTORAT UE PB 2013-2014 – Petit Bassin

## Séance n°5

### *Embryologie et anatomie des seins* Pujol

#### QCM n°1 : C, E

- A. Faux. Les crêtes mammaires sont des épaissements ectodermiques.
- B. Faux. Au 8ème mois.
- C. Vrai**
- D. Faux. De polymastie.
- E. Vrai.** On parle de stroma.

#### QCM n°2 : A, B, D, E

- A. Vrai**
- B. Vrai**
- C. Faux. Glandes aréolaires = glandes sébacées
- D. Vrai.**
- E. Vrai**

#### QCM n°3 : F

- A. Faux. Peu ou pas efficaces.
- B. Faux. On parle de prolongement du fascia clavi-pectoral vers le processus axillaire du corps mammaire.
- C. Faux. Pas les pédicules vasculo-nerveux.
- D. Faux. Ligaments suspenseurs du sein au pluriel !
- E. Faux. Intra-glandulaires!
- F. Vrai.**

#### QCM n°4 : B

- A. Faux: C'est le contraire.
- B. Vrai**
- C. Faux: Il est absent au niveau du complexe aréolo-papillaire.
- D. Faux: il permet l'érection du mamelon.
- E. Faux: La papille mammaire est composée de tissu conjonctif fibro-élastique dermique. C'est le muscle sphincter de la papille qui est composé de fibres musculaires verticales et circulaires entourant les conduits lactifères.

#### QCM n°5 : D, E

- A. Faux: Il est tendu entre les deux feuillets du fascia superficiel du thorax.
- B. Faux: c'est une structure AREOLAIRE et lobulaire. Le reste de l'item est vrai.
- C. Faux: On retrouve également des vaisseaux et des nerfs.
- D. Vrai.**
- E. Vrai.**

**QCM n°6 : A, C, E**

**A. Vrai.**

B. Faux: il est constitué de tissu cellulo-adipeux de 5 à 10 mm d'épaisseur. Mais il constitue quand même un plan de glissement contre la paroi thoracique.

**C. Vrai.**

D. Faux: il est situé en arrière de l'espace rétro-mammaire.

**E. Vrai.**

**QCM n°7 : A**

A. **Vrai** : les deux se produisent au cours de la 4<sup>ème</sup> semaine.

B. Faux : leur segmentation donnera, in fine, les follicules primordiaux. Ce sont les cordons gonadiques qui sont éphémères.

C. Faux : le méso-urogénital persisté jusqu'à la 8<sup>ème</sup> semaine.

D. Faux : les cellules germinales sont issues du mésoderme splanchnique de la paroi vitelline et traversent le mésentère dorsal primitif. Elles n'en sont pas issues.

E. Faux : il donne le ligament propre de l'ovaire et le ligament rond de l'utérus. Le ligament suspenseur de l'ovaire est issu de la partie crâniale du mésenchyme du mésovarium.

**QCM n°8 : D**

A. Faux. 1. 5<sup>ème</sup> mois

B. Faux. 2. 5<sup>ème</sup> semaine

C. Faux. 3. 8<sup>ème</sup> semaine

D. **Vrai.** 4. 4<sup>ème</sup> semaine

E. Faux. 5. 7<sup>ème</sup> semaine

**QCM n°9 : A, C**

**A. Vrai.**

B. Faux : ils ne forment pas le vagin en entier, seulement le fornix vaginal. La cavité vaginale est issue des bulbes sinu-vaginaux.

**C. Vrai.**

D. Faux : les conduits mésonéphriques sont bien la première structure des conduits génitaux à se développer mais cela intervient au cours de la 4<sup>ème</sup> semaine. La 7<sup>ème</sup> semaine correspond à l'apparition des conduits paramésonéphriques.

E. Faux: il s'agit des conduits paramésonéphriques.

**QCM n°10 : A, B, D, E**

**A. Vrai.**

**B. Vrai.**

C. Faux. Circulation artérielle.

**D. Vrai.**

**E. Vrai.**

**QCM n°11 : C, D**

A. Faux. Sympathique.

B. Faux. Les 3ème, 4ème et 5ème nerfs intercostaux correspondent à une innervation somatique.

**C. Vrai.**

**D. Vrai.**

E. Faux. Branches ventrales !! (PRAT)

**QCM n°12 : A, C, D**

- A. **Vrai.** On a une adaptation fonctionnelle majeure en rapport aux diverses phases d'activité génitale de la femme.
- B. Faux. L'artère thoracique descendante n'existe pas c'est l'artère thoracique interne.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.** Collatérales de l'artère thoracique interne.
- E. Faux. C'est le 5<sup>ème</sup> qui est qualifié d'artère de la papille, le plus important est le 3<sup>ème</sup>.

**QCM n°13 : C, E**

- A. Faux. Par sa face profonde
- B. Faux. C'est le réseau pré-mammaire qui peut avoir un aspect annulaire, radiaire ou en anse.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Il ne se draine pas vers les veines sous-cutanées du thorax mais de l'abdomen.
- E. **Vrai.**

**QCM n°14 : A, D, E**

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Il s'agit des plis uro-génitaux ou replis génitaux. Les bourrelets génitaux ou tubercules labio-scrotaux se forment latéralement de chaque côté des plis uro-génitaux.
- C. Faux. Il s'agit des plis urogénitaux.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

**QCM n°15 : A, B, E**

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Sur sa face dorsale.
- D. Faux. Le conduit longitudinal de l'épiphore.
- E. **Vrai.**

**QCM n°16 : A, B, D, E**

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. C'est l'inverse.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**