



TUTORAT UE 5 2015-2016 – Anatomie

CORRECTION Séance n°9 – Semaine du 28/03/2016

Appareil uro-génital Professeur Prudhomme

QCM n°1 : D

- A. Faux. Les reins ont également une fonction endocrine.
- B. Faux. Les capsules surrénales ne font pas partie de l'appareil urinaire.
- C. Faux. Ils sont tous rétro ou sous péritonéaux.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. C'est l'aorte abdominale et non thoracique.

QCM n°2 : A, B, C

- A. **Vrai**
- B. **Vrai**
- C. **Vrai.** Elle est en rapport avec le muscle carré des lombes, en le muscles psoas en partie.
- D. Faux. Sa face antérieure est viscérale.
- E. Faux. Il existe une capsule rénale mais elle ne correspond pas à du péritoine.

QCM n°3 : A, C

- A. **Vrai.**
- B. Faux, la plus petite division anatomique correspond aux pyramides rénales incluent dans les lobes rénaux.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. On ne retrouve que deux petits calices à la partie moyenne du rein.
- E. Faux. Le bassinet se poursuit par l'uretère.

QCM n°4 : A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Ils se projettent respectivement aux bords supérieur de T11 et bord supérieur de L3.
- C. Faux. Ils se projettent en regard de la vertèbre L1;
- D. Faux. Il s'agit des processus transverses et non épineux de L3.
- E. **Vrai.**

QCM n°5 : B, E

- A. Faux. Elles naissent du bord latéral de l'aorte.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Les artères polaires naissent directement de l'aorte.
- D. Faux. Les veines rénales se situent en avant des artères rénales.
- E. **Vrai.**

QCM n°6 : A, D, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le muscle diaphragme recouvre seulement en partie la loge.
- C. Faux. C'est l'inverse.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°7 : C, D, E

- A. Faux. C'est un rapport postérieur.
- B. Faux. Il s'agit du fascia de Toldt, le reste de l'item est vrai.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°8 : A, C

- A. **Vrai**
- B. Faux. Ce sont les veines surrenaliennes qui participent à cette fonction.
- C. **Vrai.** Les composantes sont la médullosurrénale et la corticosurrénale.
- D. Faux. La corticosurrénale sécrète les minéralo-corticoïdes, glucocorticoïdes et androgènes. La médullosurrénale sécrète les catécholamines.
- E. Faux. Les gonades en sécrètent également.

QCM n°9 : A, B

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.** Ces cellules vont former la corticosurrénale.
- C. Faux. 3 correspond au mésentère dorsal et n'a pas de rôle propre dans l'embryologie des capsules surrenales.
- D. Faux. C'est le lieu de formation entre autres des reins et gonades. Il s'agit de la concavité en médial de la structure en 4.
- E. Faux. L'embryologie des capsules surrenales explique leur double composante et non leur différence de topographie entre la capsule droite et la capsule gauche

QCM n°10 : B

- A. Faux. Elles proviennent des artères phréniques inférieures.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Elles proviennent des artères rénales à droite comme à gauche.
- D. Faux. Elle se jette dans la veine cave inférieure à droite, le reste de l'item est vrai.
- E. Faux. C'est l'inverse, bord caudal de la veine rénale pour la veine gonadique et bord crânial pour la veine surrenalienne.

QCM n°11 : A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Au niveau du trigone vésical.
- C. Faux. La portion lombale est en rapport avec le muscle psoas.
- D. Faux. Cela s'explique également par le déport vers la gauche de la bifurcation iliaque.
- E. **Vrai.** En aval de la bifurcation aortique, en amont et en avant de la bifurcation iliaque interne/iliaque externe.

QCM n°12 : A, B, D

- A. **Vrai**
- B. **Vrai**
- C. Faux. A droite elle s'abouche dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale gauche.
- D. **Vrai**
- E. Faux. C'est une branche de l'artère iliaque interne.

QCM n°13 : B, C, D

- A. Faux. Ils s'abouchent à la face postérieure de la vessie.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. L'uretère croise avec l'artère vésiculo-déférentielle.

QCM n°14 : B, C

- A. Faux. C'est un réservoir musculo-muqueux.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Il y a deux faces antéro-latérales.
- E. Faux. Il se situe en inférieur, c'est le lieu d'émergence de l'urètre.

QCM n°15 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elle diffère au niveau du trigone vésical.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Les uretères sont d'abord rétro-péritonéaux puis sous-péritonéaux.
- E. **Vrai.**

QCM n°16 : E

- A. Faux. Seul le ligament pubo-vésical est un moyen de fixité de la vessie.
- B. Faux. C'est le cul de sac recto prostatique.
- C. Faux. C'est le septum recto vésical.
- D. Faux. La terminaison se fait sur l'aponévrose du muscle levator ani.
- E. **Vrai.**

QCM n°17 : C

- A. Faux la prostate ne produit pas d'hormones sexuelles.
- B. Faux. C'est l'inverse.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. L'ampoule déférentielle se forme avant l'entrée dans la prostate.
- E. Faux. L'urètre débute dès le col vésical.

QCM n°18 : E

- A. Faux. La base est convexe.
- B. Faux. C'est l'inverse, de plus en avant il s'agit de l'urètre.
- C. Faux. Il est ouvert arrière.
- D. Faux. Elle est majoritairement sujette aux adénomes, la zone périphérique est-elle sujette à l'apparition de cancer.
- E. **Vrai.**

QCM n°19 : A, B, D, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. La paroi des testicules est très solide.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**

QCM n°20 : C,E

- A. Faux. C'est le col qui est inséré dans le vagin.
- B. Faux. C'est l'inverse.
- C. **Vrai.**

- D. Faux. 30°
- E. **Vrai.**