



TUTORAT UE APB 2015-2016

Séance n°2 – Semaine du 11/04/2016

½ parois pelvis-périnéales et périnée féminin.
Professeur Pujol.

Séance préparée par Berin BIRGEN, Léa FABRE,
Benjamin GENRE GRANDPIERRE et Edwige ISSARTEL. (ATM²)

QCM n°1 : Concernant les généralités sur les fascias pelviens, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Ils correspondent à des lames fibreuses d'origine parenchymateuse.
- B. Ils correspondent au prolongement du fascia transversalis au niveau du pelvis major.
- C. On retrouve les fascias pelviens pariétal et viscéral, tous deux au contact des viscères et des parois du petit bassin.
- D. Le fascia pelvien pariétal délimite avec le péritoine pelvien l'espace péritonéal pelvien.
- E. Les gaines formées par les fascias pelviens comprennent des réseaux vasculaires pelviens uniquement.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°2 : Concernant le fascia pelvien pariétal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le plexus sacral est compris entre la face latérale du fascia pelvien pariétal et la paroi ostéo-musculaire du petit bassin.
- B. Son bord périphérique s'insère entre autres dorso ventralement, sur la ligne arquée, le bord inférieur du foramen obturé, le corps du pubis.
- C. On retrouve entre autres parmi les fascias pelviens, le fascia pelvien pariétal et le fascia pelvien du muscle piriforme.
- D. De par son bord médial, il renforce entre autres des ligaments comme les ligaments ano-coccygiens et les ligaments pubo vaginaux.
- E. Il se prolonge médialement avec le fascia pelvien viscéral pour englober tous les viscères pelviens.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°3 : Concernant le fascia pelvien viscéral, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. La présence de péritoine sur certaines faces des viscères le rend mince voire inexistant sur ces faces-là.
- B. Il a un rôle fonctionnel minime.
- C. Il s'étend entre le péritoine pelvien et le fascia pelvien pariétal.
- D. Il se poursuit par le fascia pelvien pariétal qui lui-même se prolonge en haut par le tissu extra-péritonéal pelvien.
- E. Il enveloppe en partie les 4 organes du petit bassin.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°4 : Concernant les voies de communication, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le pédicule vasculo-nerveux pudendal interne sort du petit bassin par la grande ouverture sciatique et rentre par la petite ouverture sciatique.
- B. On retrouve au niveau du canal obturateur le paquet vasculo-nerveux obturateur.
- C. Pour rejoindre la région glutéale, le nerf sciatique doit passer par un espace ménagé par le fascia pelvien pariétal.
- D. La grande ouverture sciatique est elle-même divisée en gouttière supra-piriforme, qui laisse passer les vaisseaux glutéaux supérieurs, et infra-piriforme pour le nerf sciatique par exemple.
- E. Le canal obturateur permet la communication entre la région pelvienne et la région fémorale médiale.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°5 : Concernant les fascias pelviens, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le fascia pelvien pariétal joue un rôle de soutien pour les viscères du petit bassin.
- B. Les épaissements tendineux formés par le fascia pelvien pariétal sont à disposition stellaire en regard de l'épine iliaque.
- C. Le péritoine qui limite en haut l'espace extra-péritonéal pelvien correspond au feuillet pelvien de celui-ci.
- D. L'organisation des fascias pelviens crée des cloisonnements viscéraux malgré leur rôle fonctionnel commun lors de phénomènes physiologiques et/ou pathologiques.
- E. La ligne bi-ischiatique divise le périnée en 2 triangles anatomiques, en avant le périnée uro-génital et en arrière le périnée anal.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°6 : Concernant les généralités sur le périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le périnée correspond à la partie du tronc qui se situe au-dessus du diaphragme pelvien.
- B. C'est un espace de forme triangulaire limité par la symphyse pubienne en avant, et les deux tubérosités ischiatiques latéralement.
- C. C'est une région superficielle traversée entre autres par le segment inférieur du tractus génital.
- D. Le périnée est limité latéralement par les branches du pubis et de l'ischium et le ligament sacro-épineux.
- E. La ligne bi-ischiatique divise le périnée en 2 espaces anatomiques.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°7 : Concernant les généralités sur le périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le périnée est constitué par le périnée uro-génital en avant, et le périnée anal en arrière.
- B. Le périnée comprend trois plans qui sont le plan cutané, l'espace superficiel du périnée et l'espace profond du périnée.
- C. Le centre tendineux du périnée contient seulement des fibres musculaires lisses.
- D. Le centre tendineux du périnée a une forme pyramidale aux limites peu nettes.
- E. Le centre tendineux du périnée est un point d'ancrage musculaire, notamment pour les muscles élévateurs de l'anus.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°8 : Concernant le périnée uro-génital, choisir la ou les proposition(s) exactes.

- A. Le périnée uro-génital contient des muscles, des glandes vulvaires et des organes érectiles comme la vulve.
- B. Les muscles transverses superficiels du périnée sont des muscles très développés.
- C. Les muscles ischio-caverneux sont satellites des corps caverneux : ils ont donc un trajet médialement vers l'arrière.
- D. Les muscles transverses superficiels du périnée sont des muscles qui s'insèrent, entre autres, au niveau de la face médiale de la branche de l'ischium.
- E. Les muscles ischio-caverneux et bulbo-spongieux s'insèrent, entre autres, sur la branche de l'ischium.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°9 : Concernant l'espace superficiel du périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Il est limité en bas par le fascia superficiel du périnée et en haut par le fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- B. Le fascia superficiel du périnée est tendu entre le bord inférieur des branches ischio-pubiennes et le coccyx.
- C. Il contient des muscles, dont les muscles ischio-spongieux.
- D. Les muscles ischio-caverneux s'insèrent en avant sur l'albuginée des corps caverneux.
- E. Le diaphragme uro-génital est composé de différents muscles, dont, entre autres, le muscle sphincter externe de l'urètre.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°10 : Concernant les muscles bulbo-spongieux, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Ils sont satellites des bulbes spongieux.
- B. Ils s'insèrent en avant sur le centre tendineux du périnée.
- C. Ils se terminent en 2 faisceaux, dont le faisceau supérieur qui s'insère sur la face dorsale du clitoris.
- D. Ils recouvrent totalement, de chaque côté, la glande vestibulaire majeure.
- E. Le muscle compresseur de la veine dorsale du clitoris est formé par un des faisceaux de terminaison du muscle bulbo-spongieux.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°11 : Concernant les organes érectiles et les glandes vestibulaires, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les corps caverneux sont pairs et sont homologues au corps spongieux chez l'homme.
- B. Les bulbes vestibulaires sont au contact des glandes vestibulaires mineures.
- C. Les bulbes vestibulaires sont dédoublés avec une forme de fer à cheval à ouverture dorsale.
- D. Le clitoris est recouvert par un repli cutané dépendant des grandes lèvres : le prépuce du clitoris.
- E. Les glandes vestibulaires mineures correspondent à des glandes sébacées et sudoripares.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°12 : Concernant l'espace profond du périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les espaces profond et superficiel du périnée sont séparés l'un de l'autre par l'intermédiaire du fascia inférieur du diaphragme uro-génital.
- B. Les fascias supérieur et inférieur du diaphragme uro-génital se dirigent ventralement pour participer à la formation du ligament suspenseur du clitoris.
- C. Les muscles transverses superficiels du périnée, pairs et inconstants, sont tendus entre les branches de l'ischium et le centre tendineux du périnée.
- D. Le diaphragme pelvien est composé du muscle sphincter externe de l'urètre et des muscles transverses profonds.
- E. Le muscle uréthro-vaginal possède des fibres circulaires entourant l'urètre proximal et les faces ventro-latérales du vagin.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°13 : Concernant le périnée anal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le périnée anal correspond au triangle anal, postérieur par rapport au périnée uro-génital.
- B. Le périnée anal est délimité en bas par le fascia superficiel du périnée, prolongé en avant par le fascia superficiel de l'abdomen et en arrière par le fascia superficiel du diaphragme uro-génital.
- C. Le fascia superficiel est séparé du corps adipeux des fosses ischio-rectales.
- D. Le périnée anal contient le muscle sphincter externe de l'anus entourant la partie supérieure du canal anal en dessus du diaphragme pelvien.
- E. Le ligament ano-coccygien sert à relier la partie superficielle du sphincter externe de l'anus au coccyx.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°14 : Concernant le périnée anal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le muscle sphincter externe de l'anus est composé de 3 parties qui sont, de la superficie vers la profondeur : les parties superficielle, sous – cutanée et profonde.
- B. La partie profonde du muscle sphincter externe de l'anus mesure 15 mm de largeur.
- C. Le ligament ano-coccygien, lame impaire et musculo-conjonctive fait partie du périnée anal.
- D. La partie profonde du sphincter externe de l'anus est la plus épaisse et elle est en liaison avec un des muscles du diaphragme pelvien.
- E. Le sphincter externe de l'anus est un muscle lisse.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°15 : Concernant les fosses ischio-rectales, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les fosses ischio-rectales correspondent à l'espace ventro-rectal.
- B. C'est un espace pair triangulaire à base inférieure.
- C. Elle est délimitée en bas par le fascia superficiel du périnée.
- D. Le sphincter externe de l'anus, impair, est responsable de l'occlusion du rectum.
- E. Sa paroi latérale est verticale tandis que sa paroi médiale est oblique en haut et en médial.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°16 : Concernant les fosses ischio-rectales, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. La paroi médiale est constituée en bas par la partie profonde du sphincter externe de l'anus.
- B. Le prolongement ventral des fosses ischio-rectales est limité en avant par le bord postérieur du diaphragme uro-génital.
- C. Le prolongement dorsal est limité au-delà de la région anale vers la petite incisure ischiatique le long du ligament sacro-tubéral, sous le muscle moyen fessier.
- D. Les deux espaces pelvi-rectaux peuvent se communiquer dans la région dorsale au-dessous du ligament ano-coccygien.
- E. Le canal pudendal est plaqué contre sa paroi latérale verticale.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°17 : Concernant la vulve, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. De forme ovoïde, la vulve est limitée à sa partie supérieure par le fascia inférieur du diaphragme pelvien.
- B. La vulve présente des grandes lèvres au niveau desquelles se terminent de chaque côté le ligament suspenseur de l'ovaire.
- C. Le mont du pubis est une structure tégumentaire et cellulo-adipeuse en continuité avec la graisse abdominale.
- D. Les petites lèvres sont réunies en avant par la commissure antérieure de la vulve.
- E. Les grandes lèvres sont les homologues du scrotum chez l'homme.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°18 : Concernant les petites lèvres, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Elles se divisent chacune dans leur partie ventrale en deux parties : latérale et médiale.
- B. Le sillon génito-fémoral sépare la face médiale des cuisses et les petites lèvres.
- C. Elles limitent entre-elles la fente vulvaire.
- D. Chez la femme vierge, elles sont reliées par un pli transverse qui correspond au frein des lèvres.
- E. Elles rejoignent en arrière les faces médiales des grandes lèvres.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°19 : Concernant le vestibule, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Il s'agit d'une fente comprise entre les petites lèvres.
- B. Il présente deux régions : en avant le vestibule urétéral et en arrière le vestibule du vagin.
- C. Le vestibule du vagin est séparé des petites lèvres par le sillon vestibulaire.
- D. Le sillon vestibulaire présente l'abouchement des glandes vestibulaires mineures.
- E. Au niveau du canal vulvaire on retrouve l'abouchement des glandes vestibulaires majeures et mineures.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°20 : Concernant la vascularisation de la vulve, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. L'artère dorsale du clitoris est une branche terminale de l'artère pudendale externe.
- B. Les grandes et petites lèvres sont vascularisées ventralement par les artères pudendales internes.
- C. L'artère profonde du clitoris est une branche collatérale de l'artère pudendale interne.
- D. Les bulbes vestibulaires sont entre autres vascularisés par les artères vaginales antérieures.
- E. L'artère profonde du clitoris vascularise entre autres les corps caverneux.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.