



TUTORAT UE APB 2014-2015 – Petit Bassin

Séance n°2 – Semaine du 13/04/2015

½ parois pelvi-périnéales et périnée féminin Professeur Pujol

Séance préparée par Constance RIVIERE et Léa SAVATER (ATM²)

QCM n°1 : Concernant les généralités sur les fascias, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Au-dessous du plan du détroit supérieur, le fascia transversalis se prolonge par les fascias pelviens.
- B. Les parties viscérale et pariétale du fascia pelvien sont en continuité.
- C. Des épaisissements des fascias pelviens viscéral et pariétal réalisent des gaines réservées exclusivement aux vaisseaux sanguins.
- D. Les fascias sont des lames fibreuses d'origine mésenchymateuse.
- E. Le fascia pelvien pariétal renforce entre autres le centre tendineux du périnée.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°2 : Concernant le fascia pelvien pariétal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Son bord périphérique s'insère, entre autres, ventro-dorsalement sur le corps du pubis, le bord inférieur du canal du foramen obturé et le corps de l'ischium.
- B. La face latérale du fascia pelvien pariétal permet de séparer la paroi pelvienne des plexus nerveux.
- C. Il présente des renforcements tendineux formant un triangle centré sur l'épine ischiatique.
- D. Le fascia pelvien pariétal, élément de protection, isole complètement les éléments qui lui sont médiaux par rapport à ceux qui lui sont plus périphériques.
- E. Le fascia pelvien pariétal est formé, entre autres, d'une partie du fascia obturateur interne et du fascia pelvien du muscle piriforme.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°3 : Concernant le fascia pelvien viscéral, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Il délimite avec le péritoine pelvien l'espace extra-péritonéal pelvien.
- B. Il renforce des ligaments nécessaires à la fixité de viscères.
- C. Le fascia pelvien viscéral se renforce au niveau des faces péritonéales des viscères.
- D. Il délimite des voies de communication.
- E. Le fascia pelvien pariétal sépare le fascia pelvien viscéral du tissu extra-péritonéal de l'abdomen.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°4 : Concernant les voies de communication, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le fascia obturateur interne est perforé pour permettre le passage du paquet vasculo-nerveux obturateur.
- B. Le canal obturateur permet une communication entre les régions pelvienne et glutéale.
- C. Le nerf pudendal sort du pelvis par la petite ouverture sciatique.
- D. En arrière et latéralement à la petite ouverture sciatique, on peut voir le passage de tous les éléments glutéaux.
- E. Les vaisseaux glutéaux rejoignent la région glutéale en passant par la grande ouverture sciatique.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°5 : Concernant les fascias, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le fascia pelvien pariétal participe à l'enveloppe qui tapisse la face médiale des parois abdominale et pelvienne.
- B. Les fascias vésical, vaginal, utérin et ovarique sont des parties du fascia pelvien viscéral.
- C. À certains endroits, le fascia pelvien pariétal peut être confondu avec l'adventice des viscères pelviens.
- D. Les fascias pelviens viscéraux organisent la cavité pelvienne par la création de cloisonnements viscéraux.
- E. La solidarité des fascias et viscères entraîne une immobilité viscérale.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°6 : Concernant les généralités sur le périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Il appartient au petit bassin.
- B. Possédant les mêmes limites que le détroit inférieur, il s'agit comme celui-ci d'un plan.
- C. Il est traversé par l'urètre, le vagin et le rectum.
- D. Il est limité en bas par la peau.
- E. La ligne bi-ischiatique permet de diviser le losange qu'est le périnée en deux triangles anatomiques.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°7 : Concernant les généralités sur le périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le périnée anal contient principalement les fosses ischio-anales.
- B. Le centre tendineux du périnée est constitué uniquement de fibres élastiques et musculaires lisses.
- C. Le centre tendineux du périnée est en continuité par sa partie supérieure avec le septum recto-utérin.
- D. Il est limité latéralement, entre autres, par le ligament sacro-tubérositaire qui est recouvert par la limite inférieure du muscle grand glutéal
- E. Le centre tendineux du périnée est retrouvé médialement entre le périnée uro-génital et le périnée anal.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°8 : Concernant le périnée uro-génital, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Il est constitué de la surface vers la profondeur : du plan cutané, de l'espace superficiel du périnée, de l'espace profond du périnée et du fascia pelvien pariétal.
- B. L'espace superficiel du périnée est limité par les fascias superficiel et profond du périnée.
- C. Le fascia superficiel du périnée est prolongé en avant par le fascia superficiel de l'abdomen et en arrière par le centre tendineux du périnée.
- D. Les muscles transverses superficiels du périnée stabilisent le centre tendineux du périnée, ils sont pour cette raison toujours présents.
- E. Le fascia périnéal superficiel s'insère en arrière sur le ligament périnéal transverse.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°9 : Concernant le périnée uro-génital, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les muscles ischio-caverneux ont pour rôle la compression des bulbes vestibulaires.
- B. Le diaphragme uro-génital est composé des muscles transverses profonds et sphincter externe de l'urètre.
- C. Les muscles ischio-caverneux s'insèrent sur la face médiale des branches de l'ilium.
- D. Les muscles transverses superficiels du périnée et ischio-caverneux s'insèrent sur le centre tendineux du périnée.
- E. Les muscles élévateurs de l'anus, compris dans l'espace superficiel du périnée, s'insèrent sur le centre tendineux du périnée.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°10 : Concernant les muscles bulbo-spongieux, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Ils s'insèrent sur la face ventrale du rectum.
- B. Ils se terminent, entre autres, en un faisceau supérieur sur la face dorsale du clitoris.

- C. Un des deux faisceaux terminaux fusionne avec son homologue contro-latéral pour former le ligament suspenseur du clitoris.
- D. Chacun des muscles recouvre en partie une glande vestibulaire mineure et le bulbe vestibulaire.
- E. Ils se situent plus en profondeur par rapport au diaphragme uro-génital.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°11 : Concernant les organes érectiles et les glandes vulvaires, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les bulbes vestibulaires, mesurant environ 35mm de long, sont au contact des glandes vestibulaires qui les recouvrent en partie.
- B. Les corps caverneux dans leur partie ventrale forment les piliers du clitoris puis se réunissent en avant de l'uretère pour former le corps du clitoris.
- C. Le clitoris est rattaché en arrière sur les branches ilio-pubiennes et en avant par le ligament suspenseur sur la symphyse pubienne.
- D. Les glandes vestibulaires mineures sont considérées comme des homologues de la prostate chez l'homme.
- E. Les glandes vestibulaires majeures mesurent 5 mm de long pour 10 à 15 mm d'épaisseur.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°12 : Concernant l'espace profond du périnée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le diaphragme uro-génital est un rapport supérieur de l'espace périnéal profond.
- B. Ventralement, les fascias supérieur et inférieur du diaphragme uro-génital fusionnent et participent à la formation du ligament arqué du pubis et fusionnent avec le ligament périnéal transverse.
- C. Les muscles transverses profonds du périnée sont tendus de la face médiale de la branche des ischions au centre tendineux du périnée en arrière et à la paroi latérale du vagin en avant.
- D. Le muscle uréthro-vaginal est constitué de fibres circulaires entourant l'urètre distal et les faces ventro-latérales du vagin, et de fibres arciformes entourant l'urètre proximal.
- E. Le muscle compresseur de l'urètre est composé de deux parties : le muscle uréthro-vaginal et le muscle sphincter externe de l'urètre.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°13 : Concernant le périnée anal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le périnée anal comprend, entre autres, le ligament ano-coccygien, le muscle sphincter externe de l'anus, les fosses ischio-rectales et le fascia superficiel qui constitue sa limite inférieure.
- B. Le muscle sphincter externe de l'anus comprend des fibres arciformes entourant la partie inférieure du canal anal.
- C. La partie sous cutanée du muscle sphincter externe de l'anus entourant l'anus est la plus épaisse.
- D. La partie superficielle du muscle sphincter externe de l'anus est tendue entre en avant le centre tendineux du périnée et en arrière le ligament ano-coccygien.
- E. L'occlusion du rectum est assurée par la partie sous cutanée du muscle sphincter externe de l'anus.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°14 : Concernant le périnée anal, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le corps adipeux de la fosse ischio-rectale est en continuité avec le fascia profond.
- B. Le muscle sphincter externe de l'anus est pair.
- C. La partie profonde du muscle sphincter externe de l'anus est en liaison avec le muscle pubo-rectal en arrière, qui appartient au muscle élévateur de l'anus, et avec le centre tendineux du périnée en avant.
- D. Le ligament ano-coccygien est une lame conjonctive.
- E. La partie superficielle du muscle sphincter externe de l'anus mesure 15 mm de largeur.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°15 : Concernant les fosses ischio-rectales, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Elles sont profondes de 15 à 20 cm.
- B. Elles sont situées entre en haut le diaphragme uro-génital et en bas la peau de la région anale.
- C. Leur paroi latérale et verticale est limitée par l'os coxal, ainsi que le fascia et le muscle obturateurs internes.
- D. Elles contiennent un important corps adipeux cloisonné par des tractus fibreux créant de nombreux lobules.
- E. Elles sont limitées en avant par le bord postérieur du diaphragme pelvien.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°16 : Concernant les fosses ischio-rectales, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. L'espace pelvi-rectal est pair, triangulaire à sommet supérieur.
- B. En postérieur, une communication est possible entre les deux fosses, au-dessus du ligament ano-coccygien.
- C. Leur paroi médiale oblique est constituée du muscle sphincter externe de l'anus et du muscle élévateur de l'anus.
- D. Elles s'ouvrent en arrière vers les petites incisures ischiatiques, c'est à dire sous le muscle grand fessier et le long du ligament sacro-tubérositaire.
- E. Elles contiennent, entre autres, les vaisseaux pudendaux internes et le nerf pudendal contenus dans le canal pudendal.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°17 : Concernant la vulve, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. De forme ovoïde, elle correspond au cloaque uro-génital féminin qui s'étend du mont pubis à l'anus.
- B. Le mont pubis est un relief médian supérieur à la symphyse pubienne.
- C. Le vestibule de l'urètre est la partie postérieure du canal vulvaire.
- D. Le sillon inter-labial sépare le vestibule du vagin des petites lèvres.
- E. Les organes érectiles comprennent le clitoris, les bulbes vestibulaires ainsi que les glandes vulvaires.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°18 : Concernant les grandes lèvres, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Le fascia superficiel du périnée les traverse en profondeur puis se continue par le fascia transversalis.
- B. Elles forment deux plis de 7 à 8 cm de long, qui s'étendent du mont pubis jusqu'à l'anus.
- C. Elles sont séparées entre elles en arrière et en haut par la commissure postérieure.
- D. Les muscles transverses profonds du périnée sont stabilisateurs du centre tendineux du périnée.
- E. Le sillon génito-fémoral sépare la face médiale des jambes et les grandes lèvres.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°19 : Concernant les petites lèvres, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Elles sont l'homologue du scrotum chez l'homme.
- B. Elles constituent une lame conjonctivo-adipeuse en continuité en avant avec celle du mont pubis.
- C. La partie latérale de chaque petite lèvre rejoint son homologue homo-latéral pour former le prépuce du clitoris.
- D. L'union des parties médiales des petites lèvres forme en avant le frein du clitoris ou frein des lèvres.
- E. Ce sont des formations musculaires situées entre les grandes lèvres, de part et d'autre de l'ouverture du vagin.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.

QCM n°20 : Concernant la vascularisation de la vulve, choisir la ou les proposition(s) exacte(s).

- A. Les artères pudendales internes donnent des branches telles que les artères profondes et dorsales du clitoris respectivement à destination des corps caverneux du clitoris et du gland du clitoris.
- B. Les petites lèvres sont vascularisées en avant par les artères pudendales externes et en arrière par les artères pudendales internes.

- C. Les veines fémorales donnent les veines grandes saphènes qui assurent le drainage superficiel du clitoris.
- D. Il existe trois courants de drainage veineux, un superficiel, un profond et un pour le clitoris.
- E. Le plexus utéro-vaginal est à l'origine du nerf dorsal du clitoris et du nerf ilio-inguinal.
- F. Toutes les propositions précédentes sont fausses.