

TUTORAT UE APB 2013-2014 – Petit Bassin

CORRECTION Séance n°4 – Semaine du 28/04/2014

Ligaments larges - Annexes utérines - Vagin - Topographie pelvienne

Pr Pujol

QCM n°1 : B, C, D, E

- A. Faux. Par le prolongement du péritoine et non de l'adventice.
- B. Vrai.**
- C. Vrai.**
- D. Vrai.**
- E. Vrai.**
- F. Faux

QCM n°2 : D

- A. Faux. Pour les ligaments larges, on parle de faces postéro-supérieure et antéro-inférieure.
- B. Faux. Le segment latéral du mésovarium est mobile.
- C. Faux. Le bord mésovariique de l'ovaire (où se situe le hile) est antérieur.
- D. Vrai.**
- E. Faux. Le mésovarium s'accrole autour du hile de l'ovaire. L'ovaire est donc situé dans la cavité péritonéale
- F. Faux.

QCM n°3 : B, E

- A. Faux. Il n'y a qu'une seule fosse supra-vésicale ! Elle est en revanche bien prolongée latéralement par les fosses para-vésicales.
- B. Vrai.** A droite avec l'appendice vermiforme et plus rarement le caecum.
- C. Faux. Ces limites correspondent aux limites du récessus tubo-ovarique. C correspond à la fosse ovarique.
- D. Faux. Ce sont les fosses pré-ovariques qui sont triangulaires et limitées latéralement par les vx iliaques externes.
- E. Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°4 : F

- A. Faux. Ce sont donc des organes dotés d'une mobilité importante ainsi qu'un péristaltisme grâce à la présence d'épithéliocytes ciliés et de nombreuses fibres musculaires.
- B. Faux. Elles présentent une direction transversale seulement jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec l'ovaire au niveau de son extrémité utérine. Ensuite, elles se verticalisent.
- C. Faux. C'est le ligament suspenseur de l'ovaire qui contient les vaisseaux et plexus nerveux ovariens. Le reste de l'item est vrai.
- D. Faux. Elles se placent successivement en regard de l'extrémité utérine de l'ovaire, du bord mésovariique de l'ovaire, de la face médiale de l'extrémité tubaire ovarienne et enfin du bord libre ovarienne.
- E. Faux. Elles ont 4 portions, il manque la partie utérine, portion la plus proximale.
- F. Vrai.**

QCM n°5 : A, B, C, D

- A. **Vrai.** Le diamètre de l'ampoule est de 8 mm contre 2 mm pour l'isthme.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. La partie utérine est située dans l'épaisseur du muscle utérin ou myomètre. Elle possède bien un trajet en haut et en dehors.
- F. Faux.

QCM n°6 : C

- A. Faux. Les éléments vasculo-nerveux tubaires sont au niveau de la sous-séreuse.
- B. Faux. Les plis muqueux de 10ème ordre sont retrouvés au niveau de l'ampoule, au niveau isthmique il y a seulement des plis secondaires. Le reste de l'item est vrai.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Seulement latéralement. C'est l'ampoule qui est en rapport en arrière avec les anses grêles.
- E. Faux. L'isthme tubaire gauche est bien en rapport latéralement avec le côlon sigmoïde, mais c'est l'ampoule tubaire gauche qui est en rapport en arrière avec le côlon sigmoïde. "
- F. Faux.

QCM n°7: A, C, D

- A. **Vrai.** (L'artère du fundus utérin est une collatérale de l'artère utérine).
- B. Faux. L'arcade anastomotique infra tubaire donne seulement les artéioles spiralées. L'artère du fundus utérin naît de l'artère utérine, en amont de la formation de l'arcade anastomotique infra tubaire.
- C. **Vrai.** Elle relie les arcades anastomotiques infra-tubaire et infra-ovarique.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Il s'agit du corps et non du col utérin.
- F. Faux.

QCM n°8 : E

- A. Faux. Avec l'axe du col.
- B. Faux. L'extrémité supérieure, où s'insère le col de l'utérus, reste cylindroïde en toute circonstance.
- C. Faux. Le début de l'item est vrai mais seule la colonne antérieure bifurque pour former le triangle vaginal, unique.
- D. Faux. Trois tuniques (muqueuse, musculaire et adventicielle) même si la musculaire présente deux couches de fibres.
- E. **Vrai.** L'introït du vagin se situe au niveau du vestibule.
- F. Faux.

QCM n°9 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Ils passent au niveau du segment vésical pour s'aboucher dans la vessie.
- C. **Vrai.** 40mm pour le segment rectal contre 20mm pour le segment péritonéal. La taille du segment anal n'est pas précisée mais elle est encore inférieure.
- D. Faux. Pour les parois latérales on parle de segments pariétal et PELVIEN. Le reste de l'item est vrai.
- E. **Vrai.**
- F. Faux

QCM n°10 : C, D

- A. Faux. Attention le fornix entoure uniquement la partie vaginale du col, qui présente aussi une partie supra-vaginale.
- B. Faux. Le fornix est situé plus en dessous, et répond antérieurement à la fosse rétro-trigonale.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**

- E. Faux. L'hymen est un repli muqueux INCOMPLET.
- F. Faux.

QCM n°11 : A, B, C

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.** Pour Pujol, intra-péritonéaux = dans la cavité péritonéale mais pas recouvert de péritoine.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. C'est l'inverse, on parle de bords mésovarique et libre et de faces latérale et médiale.
- E. Faux. 4cm de long, 2 cm de large et 1 cm d'épaisseur.
- F. Faux.

QCM n°12 : A, B

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Le ligament suspenseur de l'ovaire prend son origine en regard du muscle grand psoas.
- D. Faux. Il n'y a qu'une frange ovarique ; c'est la plus grande des franges tubaires.
- E. Faux. 30mm
- F. Réponse.

QCM n°13 : A, B, C, D, E

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.** Dans la fosse infra-ovarique.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Avec l'artère utérine en avant et le bord du sacrum en arrière.
- F. Faux

QCM n°14 : A, B, C

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Elle est proche des vaisseaux iliaques externes et de la trompe utérine.
- E. Faux. Au ligament propre de l'ovaire.
- F. Faux.

QCM n°15 : C

- A. Faux. Les artères ovariennes naissent en regard du disque intervertébral L2-L3 contre L1 pour les artères rénales.
- B. Faux. Seulement la droite, la gauche surcroise le muscle grand psoas.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Elles croisent les artères iliaques externes.
- E. Faux. La tubaire latérale et l'ovarienne latérale sont les terminales.
- F. Faux.

QCM n°16 : A, C, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. La veine ovarienne gauche se jette dans la veine rénale gauche.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le nerf ovarien n'existe pas. On parle simplement d'innervation ovarienne.
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°17 : A, D, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le septum vésico-vaginal se prolonge en bas par le septum urétro-vaginal.
- C. Faux. Entre la région du trigone vésical, plus bas que la fosse rétro-trigonale, et le triangle vésical.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**
- F. Faux.

QCM n°18 : D, E

- A. Faux. Il y joue le rôle de fascia pelvien viscéral.
- B. Faux. Il forme la fosse para-vésicale. L'espace para-vésical prolonge quant à lui latéralement l'espace rétro-pubien dans l'espace extra-péritonéal.
- C. Faux. Par le pli utéro-sacral.
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.** Le cul de sac recto-utérin est la région la plus déclive de la cavité péritonéale.
- F. Faux.

QCM n°19 : A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le mésomètre est une portion du ligament large, c'est donc un repli péritonéal. Il est au dessus de l'espace extra péritonéal pelvien.
- C. Faux. Pré et rétro-urétériques. C'est à ne pas confondre avec les affluences de la veine iliaque interne.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. L'espace rétro-rectal contient les ligaments supérieurs du rectum. Les espaces para-rectaux sont situés au dessus des ligaments latéraux du rectum.
- F. Faux.

QCM n°20 : B, D, E

- A. Faux. Ce sont les ligaments pubo-vésicaux qui contiennent des fibres musculaires.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Ce sont les ligaments utéro-sacraux qui se terminent sur le fascia pré-sacral (S2-S4).
- D. **Vrai.**
- E. **Vrai.**
- F. Faux.